

Флазон 500 мг

Лекарственная форма: Вагинальные суппозитории.

Состав: Каждый суппозиторий содержит: Активное вещество: метронидазол 500 мг.

Вспомогательные вещества: полиэтилен гликоль 1500 и 400.

Фармакотерапевтическая группа: Противопротозойное средство.

Показания к применению:

Флазон предназначен для местного лечения некоторых вагинальных инфекций: влагиалищный трихомонад (*Trichomonas vaginitis*) и неспецифический вагинит.

Противопоказания:

Флазон противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к Метронидазолу или другим производным Нитроимидазола.

Способ применения и дозы:

Предназначен только для взрослых.

–Трихомонадный вагинит (*Trichomonas vaginitis*) – 1 суппозиторий в день, который необходимо глубоко ввести во влагалище, в течение 10 дней, в сочетании с лекарственной формой для внутреннего приема.

–Неспецифический вагинит – 1 вагинальный суппозиторий в день, который необходимо глубоко ввести во влагалище, в течение 7 дней, при необходимости сочетании с лекарственной формой для внутреннего приема.

Обязательное одновременное лечение полового партнера, даже если у него отсутствуют клинические проявления.

Побочное действие:

Прекратите применение Флазон и незамедлительно обратитесь к врачу.

Аллергическая реакция. Признаки могут проявляться в виде отека на руках, ногах, лодыжках, лица, губ или горла, который может вызвать затруднение глотания или дыхания, зуд, единовременную сыпь или крапивницу.

1. Серьезные, но очень редкие нарушения со стороны головного мозга (Энцефалопатия). Симптомы разные, но могут вызывать повышение температуры, ригидность шеи, головную боль, галлюцинации. Так же у Вас может быть боль в мышцах или суставах, ощущения слабости в локтях или в коленях, нарушение речи или спутанность сознания.
2. Развивается кожная сыпь, включая синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз. Они могут проявляться в виде красноватых пятен или круглых пятен, похожих на мишень, которые часто проявляются волдырями на теле, шелушением кожи, язвами во рту, горле, носу, гениталиях и глазах, которым могут предшествовать лихорадка и гриппоподобные симптомы. Прекратите использование Флазона, если у Вас появятся эти признаки и незамедлительно обратитесь к Вашему врачу или за медицинской помощью.
3. У Вас образуется красная чешуйчатая сыпь, которая распространяется под кожу волдырями, которая сопровождается лихорадкой в начале лечения (острый генерализованный экзантематозный пустулез). Сократите использование Флазона, если у Вас развиваются эти признаки и сразу же обратитесь к Вашему врачу или за медицинской помощью.
4. Пожелтение кожи и глаз. (Это может связано проблемой почками (желтуха)).
5. Неожиданные воспаления, язвы во рту, синяки, кровоточивость десен, или сильная усталость. Это может быть связано с проблемой кровью.
6. Сильная боль в желудке, которая может излучать в спину (панкреатит).

Меры предосторожности и предупреждения:

Перед применением Флазон предупредите врача или фармацевта, если:

- имеете или когда-то имели проблемы, связанные с печенью;
- проходите диализ почек;
- имеете поражения нервной системы.

Флазон и алкоголь:

Во время использования Флазон не следует употреблять алкоголь, а также после, в течение 48 часов. Может вызвать неприятные побочные осложнения, такие как: тошнота, рвота, боли в брюшной полости, вызывает покраснения и сердцебиение, головную боль.

Беременность и период кормления грудью:

Поскольку, лекарство проникает в грудное молоко, не рекомендуется применение при кормлении грудью.

Перед началом применением во время беременности и кормлении грудью всегда необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Форма выпуска:

По 5 вагинальных суппозитория в ячейках, упаковка с 2 ячейками и инструкцией по медицинскому применению.

Срок годности:

3 года.

Не использовать после истечения срока, указанного на упаковке.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном месте от детей.

Условия отпуска:

По рецепту.