

Флазон

Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь 100 мл

Состав: Флазон в качестве активного вещества содержит бензоат метронидазола. В качестве вспомогательных веществ содержит: глицерол, пропиленгликоль, полисорбат 80, ксанта, микрокристаллическая целлюлоза, пропилпарабен, метилпарабен, банановый ароматизатор и очищенная вода.

Показания к применению:

Профилактика и лечение микробных инфекций у взрослых и детей старше 1 года:

- профилактика послеоперационной бактериальной инфекции;
- бактериальные инфекции: включая инфекции крови, брюшную полость, головного мозга, легкие, костей, половой системы, послеродовые инфекции, в том числе также, лечение ран, образовавшиеся после хирургических вмешательств;
- трихомоноз, который встречается при лечении и у мужчин и женщин;
- амебиаз, который встречается при лечении паразитарных инфекций;
- лечение лямблиоза.

Для детей от 10 лет и старше и взрослые

- вагиноз, а именно вагинальная бактериальная инфекция и лечение отека;
- лечение гингивита и других стоматологических инфекций;
- язва нижних конечностей и пролежней.

Дети (от 1 до 12 лет)

- лечение у детей желудочно-кишечного тракта (*Helicobacter pylori*).

Доношенные новорожденные

- лечение бактериальных инфекций и профилактика послеоперационных инфекций.

Перед использованием Флазона необходимо предупредить врача, если у пациента:

- имеется гиперчувствительность, аллергия к метронидазолу или к другим компонентам Флазона
- имеется сыпь, зуд, проблемы с дыхательными путями;
- беременность;
- имеется непереносимость некоторых видов сахаров;
- имеется сахарный диабет.

Необходимо более внимательнее быть, поэтому сообщите врачу, если у пациентов:

- имеются проблемы, связанные с печенью;
- поражение головного или спинного мозга;
- проходит гемолиз.

Если пациент принимает Флазон более 10 дней, то возможно, что врач посчитает необходимым провести дополнительные исследования.

Необходимо сообщить врачу, если принимаете или собираетесь в этот период принимать другие препараты совместно, безрецептурные и готовые растительные, так как между ними и Флазоном может быть взаимодействие.

В частности, сообщите врачу, если Вы принимаете какие-либо из перечисленных препараты, которые взаимодействуют с Флазоном:

- Варфарин – разжижает кровь;
- Литиум – антидепрессант;
- Фенобарбитал – противоэпилептический препарат;
- 5-фторурацил – противоопухолевый препарат;
- Циклоспорин – применяют во время пересадки органов.

Если собираетесь посетить врача или стоматолога, то обязательно сообщите им, что принимаете Флазон суспензию.

Применение Флазона с пищей, или с алкоголем

В время приема Флазона не стоит употреблять алкоголь, в том числе и после приема в течение 48 часов. Это может привести к нежелательным реакциям, такие как тошнота, рвота, боли в брюшной полости, может вызвать покраснение и сердцебиение, головная боль.

Беременность и лактация

Вы не должны принимать Флазон если беременны или планируете беременность, или если Вы кормящая. Перед применением сообщите об этом лечащему врачу.

Важная информация о Флазоне 125 мг/5 мл

- Каждые 5 мл содержит 1.800 г сахарозу. Если Вам известно, что у пациента имеется непереносимость некоторых видов сахароз перед применением этого препарата, сообщите это этом врачу. При назначении пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать количество сахарозы. Это также препарат может повредить зубы.
- Данный препарат содержит метил- и пропилпарабены, которые могут вызывать аллергические реакции, возможно отсроченные.
- Данный препарат содержит глицерол. В больших дозах может принести вред и вызвать головную боль, нарушение работы желудка и запор.

Способ применения Флазона

Детская дозировка, принимаемая ребенком, зависит от назначения врача.

Для некоторых бактериальных инфекций педиатрическая доза для детей до 12 лет и младенцев назначают в соответствии от их массы тела (20-30 мг/кг/ один раз в день или 7,5 мг/кг на перерасчет в течении 8 часов 1 раз).

Применяемая доза для детей и взрослых, следующее

Профилактика послеоперационных инфекций:

Количество дней, в течение которых Вы будете принимать лекарство

- Взрослые и дети старше 12 лет: 16 мл (400 мг) 3 раза в день до операции;
- До 12 лет дети: по назначению врача в зависимости от веса ребенка.

Микробы:

Сколько принимать:

Взрослые и дети старше 12 лет. Одна доза 32 мл (800 мг), продолжать по 16 мл (400 мг) 3 раза в день.

- Дети до 12 лет – по назначению врача в зависимости от веса ребенка.

Другие микробы

Взрослые и дети старше 10 лет.

Трихоминаз

Однодневное лечения – 80 мл (200 мг) 1 раз в день;
5-7-дневное лечение – 16 мл (400 мг) 2 раза в день;
7-дневное лечение – 8 мл (400 мг) 3 раза в день.

Вагиноз

Однодневное лечения – 80 мл (2000 мг) 1 раз в день;
5-7 дневное лечение – 16 мл (400 мг) 2 раза в день;

Амеобиоз

5-10-дневное лечение – от 16 мл (400 мг) до 32 мл (800 мг) 3 раза в день.

Лямблиоз

3-дневное лечение – 80 мл (2000 мг) 1 раз в день;
5-дневное лечение – 16 мл (400 мг) 3 раза в день;
7-10-дневное лечение – 20 мл (500 мг) 2 раза в день.

Воспаление десен

3 -дневное лечение – 80 мл (2000 мг) 3 раз в день.

Воспаление полости рта

3-7-дневное лечение – 8 мл (200 мг) 3 раза в день.

Язва нижних конечностей и пролежни

7 -дневное лечение – 16 мл (400 мг) 3 раза в день, для детей младше 10 лет.

Трихомоиаз

Количество дней приема препарата – 7 дней.

Сколько принимать детям от 7-10 лет – по назначению врача, в зависимости от веса ребенка, но не более чем 2000 мг в день.

Сколько принимать детям от 3-7 лет – по назначению врача, в зависимости от веса ребенка, но не более чем 2000 мг в день.

Сколько принимать детям от 1-3 лет – по назначению врача, но не более чем 2000 мг в день.

Амебиаз

Количество дней приема препарата – 5-10 дней.

Сколько принимать детям от 7-10 лет от 8 мл (200 мг) до 16 мл (400 мг) по назначению врача, в зависимости от веса ребенка, но не более чем 2400 мг в день.

Сколько принимать детям от 3-7 лет от 4 мл (100 мг) до 8 мл (200 мг) по назначению врача, в зависимости от веса ребенка, но не более чем 2400 мг в день.

Сколько принимать детям от 1-3 лет от 4 мл (100 мг) до 8 мл (200 мг) по назначению врача, в зависимости от веса ребенка, но не более чем 2400 мг в день.

Лямблиоз

Количество дней приема препарата – 3 дня.

Сколько принимать детям от 7-10 лет: 40 мл (1000 мг) 1 раз в день, по назначению врача, в зависимости от веса ребенка.

Сколько принимать детям от 3-7 лет от 24 мл (600 мг) до 32 мл (800 мг) 1 раз в день, по назначению врача, в зависимости от веса ребенка.

Сколько принимать детям 1-3 лет: 20 мл (500 мг) 1 раз в день, по назначению врача, в зависимости от веса ребенка.

Воспаление десен

Количество дней приема препарата – 3 дня.

Сколько принимать детям от 7-10 лет :4 мл (100 мг) 3 раза в день.

Сколько принимать детям от 3-7 лет: 4 мл (100 мг) 2 раза в день.

Сколько принимать детям 1-3 лет: 2 мл (50 мг) 3 раза в день.

Лечение у детей желудочно-кишечного тракта (*Helicobacter pylori*).

Совместно с Флазоном ребенку будут назначены врачом и другие препараты, не более чем 500 мг в день в зависимости от веса ребенка.

Пожилые люди и люди с проблемами печени

Могут быть назначены более низкие дозы чем для взрослых, учитывая максимально возможную чувствительность к этому лекарству.

Возможные нежелательные эффекты Флазона

Как и другие препараты Флазон может вызывать нежелательные эффекты. Несмотря и на то, что не все нежелательные эффекты могут проявляться, однако, при их возникновении необходимо обратиться к врачу. Обратитесь к врачу, если при применении препарата возникли: аллергические реакции, которые могут выражаться сыпью, шелушением кожи, язвами на губах и во рту, неожиданными кровотечениями, спазмом горла, отдышка.

Если Вы испытываете указанные нежелательные эффекты, то незамедлительно обратитесь к врачу.

- сотрясение мозга;
- судороги;
- зуд, воспаление кожи или отек, кожная сыпь;
- сильная брюшная боль;
- пожелтение кожи или глаз (желтуха);
- проблемы, связанные с кровью, которые сопровождаются высокой температурой, лихорадкой, болью в горле, язвой во рту и в горле, непривычная усталость;
- сонливость и головокружение;
- неподвижность, нарушение координации;
- временное нарушение зрения, например, размытые изображения или двоение в глазах;
- боли в мышцах или в суставах, чувство слабости в локтях или в коленях;

- чувство замешательства;
- галлюцинации.

Предупредите врача, если:

- имеются ощущения боли в области брюшной полости и беспокойство, связанные с желудком или диареей;
- неприятный привкус во рту, «волосатый» язык;
- потеря аппетита;
- зуд;
- головная боль;
- потемнение мочи.
- боли в мышцах и суставах.

Если у Вас обнаружите нежелательные эффекты или проявление других нежелательных эффектов, которые не описаны в данном листке-вкладыше, то сообщите это Вашему лечащему врачу.

Условия хранения Флазон

- Хранить в недоступном месте от детей.
- Хранить при температуре не выше 25°C, в защищенном от света месте.
- Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на маркировке (Exp: дата, год) .
- Срок годности 3 года.
- Не использовать при изменении вида, вкуса, запаха и обратитесь в аптеку.