

Глицерин 1.0 г и 2.11 г

Лекарственная форма: суппозитории ректальные.

Состав: Каждый суппозиторий содержит: Активное вещество: Глицерол 2.11 г или 1.0 г.

Вспомогательные вещества: натрия стеарат, желатин, очищенная вода.

Фармакотерапевтическая группа: Слабительное средство

Фармакологические свойства:

Слабительное, смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке, оказывая раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя моторику кишечника.

Показания к применению:

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии.

Профилактика запоров у пациентов, которые не могут напрягаться при дефекации.

Болезненный тромбированный геморрой, трещины заднего прохода или перианальный абсцесс, аноректальный стеноз.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность относительно к составу препарату;

Кишечная непроходимость;

Геморрой в стадии обострения;

Воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки;

Проктит;

Парапроктит;

Не диагностированная боль в животе.

Способ применения:

Взрослые: 1-2 суппозитория по 2.11 г при необходимости.

Дети: 1 суппозиторий по 1.0 г при необходимости.

При возможности как можно дольше держите суппозиторий в прямой кишке, пока не произойдет дефекация.

Побочное действие:

Аллергические реакции, местные реакции (зуд и раздражение).

При длительном использовании возможно ослабление физиологического процесса дефекации.

Меры предосторожности и предупреждения:

Не использовать «Глицерин» суппозитории при систематическом лечении.

Лечение прекращается после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

Суппозитории не должны приниматься при острых болях в животе.

Суппозитории принимаются только ректально, не предусмотрены при внутреннем использовании.

Использовать с осторожностью при почечной недостаточности.

Беременность и период кормления грудью:

Безопасность применения «Глицерин» суппозитории при беременности и кормлении грудью не доказана.

Применение при беременности и кормлении грудью только по назначению врача.

Взаимодействие с другими препаратами:

С осторожностью нужно применять с диуретиками, калийно-восстановительными препаратами и минеральными маслами.

Форма выпуска:

5 ректальных суппозитория в ячейке.

2 ячейки и листок-вкладыш в коробке.

Срок годности:

3 года.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C.

Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптеки:

Без рецепта.