

Հեֆապանթեն **100 մգ + 16 մգ**

Դեղաբանական ձև. հեօտոցային մոմիկներ:

Բաղադրություն. 1 մոմիկը պարունակում է ակտիվ նյութ՝ դեֆապանտենոլ 100 մգ + ֆլորիեֆսիդին բիզլուոկոնատ 16 մգ (ֆլորիեֆսիդին բիզլուոկոնատի լուծույթի տեսքով 20% - 80 մգ):

Օժանդակ նյութեր. Հիմն մոմիկների համար. ՊՆԳ 400 և ՊՆԳ 1500:

Դեղաբանական խումբ. հյուսվածքների վերականգնման խթանիչ:

#### Փարմակոդինամիկա

Կոմբինացված դեղ սեղային օգտագործման համար գինեկալոգիայում, որը ցուցաբերում է վերականգնող, հակամանրէային և մետաբոլիկ ազդեցություն:

Քլորիեֆսիդինը ակտիվ է գրամդրական և գրամբացասական միկրոօրգանիզմների հանդեպ. *Treponema pallidum*, *Chlamydia* spp., *Ureaplasma* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, *Herpes virus*: Դեղի հանդեպ թույլ զգայուն են որոշ շտամներ. *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp., նաև կայուն են թրվակայուն բակտերիաների նրանց սպորների, սնկերի և վիրուսների հանդեպ:

Դեֆապանտենոլը խթանում է լորձաթաղանթի ռեգեներացիան, վերականգնում բջջային մետաբոլիզմը, արագացնում է միտոզը և մեծացնում կուլագենային թելերի ամրությունը: Չի խախտում լակտոբացիլների ֆունկցիոնալ ակտիվությունը: Պահպանում է ակտիվությունը (չնայած մի քիչ նվազեցված) արյան և թարախի առկայության ժամանակ:

#### Փարմակակինետիկա

Քլորիեֆսիդին բիզլուոկոնատը պրակտիկորեն չի ներծծվում ստամոքսաղիքային տրակտից: Պատահական կուլ տալու դեպքում 300 մգ C<sub>MAX</sub> հասնում է 30 րոպե հետո և կազմում է 0,206 մկգ/լ: Դուրս է բերվում հիմնականում կղանքի միջոցով 90 % , 1% -ից քիչ երկիւմներով: Ներքեօտոցային կիրառման ժամանակ գրեթե չի ներծծվում, համակարգային ազդեցություն չի թողնում:

Դեֆապանտենոլ – սեղային օգտագործման ժամանակ արագ ադսորբցիայի է ենթարկվում լորձաթաղանթի կողմից և վերածվում է պոլիմերային, կապվում է արյան պլազմայի սպիրտակուցների հետ (հիմնականում բետա – գլուբուլինների և ալբումինի հետ):

#### Կիրառման ցուցումներ

- Սուր և խրոնիկական վազինիտներ:
- Էնդո/էկզոցերվիցիտներ (արգանդի պարանոցի բարդացած էկտոպիաներ):
- արգանդի պարանոցի սպեցիֆիկ էթիոլոգիայի էրոզիաներ (կոմպլեքս բուժման կազմում):

- հեռուցի լուրձարարանի և արգանդի պարանոցի դեստրուկտիվ մեթոդով բուժումից հետո ռեզեկանցիայի լավացման համար (ինչպես նաև դիաբերմոնոպոզիտալյացիա, կրիոդեստրուկցիա, լագերային դեստրուկցիա) հետվիրահատական և հետծննդյան շրջանում:

#### Հակացուցումներ

Գերզգայունություն ախտիվ նյութի կամ օժանդակ նյութերից որևէ մեկի հանդեպ:

#### Կիրառման ձև և դեղաչափում

Կիրառում են ներհեռուցային. Կիրառումից առաջ մոմիկը հանել խցիկից:

Բուժման նպատակով. 1 մոմիկից օրը 2 անգամ (առավոտյան և երեկոյան) 7-10 օր:

Ըստ անհրաժեշտության հնարավոր է բուժման ընթացքի երկարացում մինչև 20 օր:

#### Կողմնակի երևույթներ

Հնարավոր են ալերգիկ ռեակցիաներ, ֆոբ, դեղը օգտագործումը դադարեցնելուց հետո երևույթները անհետանում են:

#### Նախազգուշացումներ

Հեֆապանտենը անհամատեղելի է անիտոնային խումբ պարունակող դեստրեգենտների հետ (սապոնիններ, նատրիումի լաուրիլսուլֆատ, նատրիումի կաոբոֆուլմեթիլցելյուլոզ) և օհաոի հետ, եթե այն կիրառվում է ներհեռուցային: Արտաֆին սեռական օրգանների հիգիենիկ խնամքը չի ազդում Հեֆապանթեն մոմիկների արդյունավետության և կիրառման վրա, քանի որ այն օգտագործվում է ներհեռուցային:

#### Հղիություն և կրծքով կերակրում

Հղիության և կրծքով կերակրման ժամանակ հակացուցված չէ, քանի որ Հեֆապանթենը ազդում է հեռուցի վրա տեղային, պրակտիկորեն չի ներծծվում:

#### Թողարկման ձև

10 հեռուցային մոմիկ խցիկում, 2 խցիկ ներդիր թերթիկով տուփում:

#### Պիտանիության ժամկետ

2 տարի:

Զօգտագործել տուփի վրա նշված պիտանիության ժամկետի ավարտից հետո:

#### Պահպանման պայմաններ

Պահել 25°C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում, չոր, լույսից պաշտպանված տեղում:

Պահել երեխաների համար անհասանելի վայրում:

Բացթողման կարգ

Առանց դեկլարումի: