

ЗИДИН 16 мг

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные по 16 мг.

Состав: 1 суппозиторий содержит: активное вещество хлоргексидина биглюконат 16мг.

Вспомогательное вещество: основа для суппозиториев: полиэтиленоксид 400 и полиэтиленоксид 1500.

Фармакотерапевтическая группа: антисептический препарат для местного применения.

Фармакологические свойства:

Зидин – антисептический препарат для местного применения, активен в отношении простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Treponema pallidum*, *Chlamidia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, *Herpes virus*. К препарату слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.*, а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы. Зидин не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет некоторую активность в присутствии крови, гноя.

Практически не всасывается из ЖКТ. После случайного проглатывания 300 мг Смак достигается через 30 мин и составляет 0,206 мкг/л. Выводится в основном с каловыми массами (90%), менее 1% выделяется почками. При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.

Показания к применению:

- При профилактике венерических заболеваний: гонореи, сифилиса, трихомониаза, гарднереллеза, хламидиоза и уреоплазмоза. Применение Зидина с профилактической целью необходимо осуществить в течение 2 часов после незащищенного полового акта, т.к. по прошествии 2 часов возбудитель проникает в клетки слизистой оболочки влагалища и становится недоступным для действия хлоргексидина.
- Для предупреждения развития инфекционно-воспалительных осложнений при акушерских и гинекологических манипуляциях: перед родами и абортom, перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями.
- Лечение хронических экзо- и эндоцервицитов, вагинитов, как специфических, так и неспецифических, с многокомпонентным составом возбудителей.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к активному веществу или к любому из вспомогательных компонентов.

Детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Перед применением суппозиторий освобождают от контурной упаковки.

Для лечения: по 1 суппозиторию 2 раза в сутки (утром и вечером), в течение 7-10 дней.

При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Для профилактики инфекций, передаваемых половым путем: 1 суппозиторий не позднее 2 часов после незащищенного полового акта.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, зуд, проходящие после отмены препарата.

Меры предосторожности и предупреждения:

Зидин не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально. Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость вагинальных суппозиторияев Зидина т.к. препарат применяется интравагинально. Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

Беременность и период кормления грудью:

Применение свечей Зидина во время беременности и при грудном вскармливании не противопоказано, так как свечи Зидин действуют локально во влагалище, практически не всасываясь.

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только после тщательной оценки ожидаемой пользы для матери и риска для плода и ребенка.

Форма выпуска:

5 вагинальных суппозиторияев в блистере, 2 блистера с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта врача.