

Ցետամուլ 100մգ/մլ

Բաղադրությունը՝ Ակտիվ բաղադրատարր՝ պարացետամուլ 100մգ/մլ

Օժանդակ նյութեր՝ պրոպիլէն գլիկոլ, սախարին նատրիում, կիտրոնաթթու, մեթիլպարաբեն, պրոպիլպարաբեն, բալի համահաղորդիչ, պանսո: Չի պարունակում էթիլ սպիրտ:

Դեղաձևը՝ ներքին ընդունման մանկական կաթիլներ, բալի համով:

Դեղաբանական խումբը՝ ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղեր:

Ֆարմակադինամիկա

Պարացետամուլը կլինիկորեն ապացուցված ցավազերծիչ և ջերմամարիչ է: Պարացետամուլի ցավազրկող ազդեցությունը պայմանավորված է ցավի շեմի բարձրացմամբ, իսկ ջերմիջեցնողը՝ ենթատեսարմբի ջերմակարգավորող կենտրոնի վրա ազդեցությամբ: Պարացետամուլն իր ցավազերծող և ջերմիջեցնող ազդեցությամբ հավասարազոր է ասպիրինին, սակայն ավելի քիչ հավանականությամբ է առաջացնում կողմնակի ազդեցություններ, որոնք հատուկ են ասպիրինին եւ ասպիրին-պարունակող դեղերին: Չի գրգռում ստամոքսաղիքային համակարգը և չի ազդում ջրաաղային փոխանակության վրա, քանի որ չի ազդում պրոստոգլանդինների սինթեզի վրա պերիֆերիկ հյուսվածքներում:

Ֆարմակակինետիկա

Պարացետամուլն արագ է ներծծվում ստամոքսաղիքային համակարգից: Արյան մեջ առավելագույն խտությունն ապահովվում է ներքին ընդունումից մոտավորապես 10-60 րոպե անց: Պարացետամուլը սեղաբաշխվում է օրգանիզմի շատ հյուսվածքներում: Բուժական դեղաչափի դեպքում պլազմայի սպիտակուցների հետ կապվում է անհեան քանակով, որն ավելանում է դեղի բարձր խտության պայմաններում: Կիսապարբերման փուլը տատանվում է 1-ից մինչև 3 ժամ: Նյութափոխանակվում է առավելապես լյարդում և արտազատվում մեզոլ՝ լծորդիչների (գլյուկուրոնիդներ և սուլֆատներ) ձևով: 5%-ից պակաս արտազատվում է անփոփոխ ձևով:

Կիրառման ցուցումներ

-որպես ջերմիջեցնող միջոց՝ սուր ռեսպիրատոր հիվանդությունների, գրիպի, մանկական վարակների և այլ բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ, որոնք ուղեկցվում են ջերմության բարձրացումով, հետպատվաստումային շրջանում,

-որպես ցավազրկող՝ բույլ եւ չափավոր ցավերի ժամանակ (գլխացավ, ատամնացավ, մկանացավ, նյարդացավ, սրավմատիկ ցավերի ժամանակ)

Կիրառման ձև և դեղաչափումը

Ցետամուլի կաթիլների դեղաչափումը կախված է երեխայի տարիքից և մարմնի քաշից: Ցետամուլի կաթիլների միանվագ դեղաչափը կազմում է 10-15մգ/կգ քաշին, օրական առավելագույնը՝ 60մգ/կգ քաշին: Դեղաչափը կարող է կրկնվել յուրաքանչյուր 4 ժամը մեկ, բայց չպետք է գերազանցի օրական 5 անգամը:

Դեղաչափը որոշվում է հետևյալ վերահաշվարկով՝ 1կգ քաշին սրվում է 2 կաթիլ Ցետամուլ:

10մգ = 2 կաթիլ

1կգ = 2 կաթիլ

Տարիք	Երեխայի քաշը կգ	Միանվագ դեղաչափ
1-3 տարեկան	Բժշկի ցուցումով	
3-5 տարեկան	6-8 կգ	12-16 կաթիլ
5 ամսեկանից 1 տարեկան	8-10 կգ	16-20 կաթիլ
1-2 տարեկան	10-12 կգ	20 - 24 կաթիլ
2-3 տարեկան	12-16 կգ	24 - 32 կաթիլ

Եթե երեխայի քաշը էապես տարբերվում է նշվածից, ապա այն պետք է համապատասխանաբար հետվի:

Ցետամոլ կաթիլները կարող են տրվել ինֆուզիայի կամ մանկական կերի, մրգային հյութի կամ ջրի հետ խառնված:

Որպես ջերմամարիչ չկիրառել 3 օրից ավել:

Որպես ցավազերծիչ չկիրառել 5 օրից ավել

Հակացուցումներ

-գերզգայնություն պարացետամոլի եւ/կամ այլ բաղադրամասերի նկատմամբ

-երիկամների եւ լյարդի ֆունկցիայի անբավարարություն

-լյարդի, երիկամների ֆունկցիայի ծանր խանգարումներ

Նախազգուցումներ

Զկիրառել պարացետամոլ պարունակող այլ դեղերի հետ զուգահեռ:

Վաղաժամ ծնված և մինչև 3 ամսական երեխաների համար օգտագործելուց առաջ խորհրդակցել բժշկի հետ:

Պատահական գերդեղաչափման դեպքում անմիջապես դիմեք բժշկի:

Հարկավոր է զգուշությամբ կիրառել ծանր երիկամային կամ լյարդային անբավարարությամբ տառապող հիվանդների մոտ, գլյուկոզ-6-ֆոսֆատդեհիդրոգենազա ֆերմենտի ժառանգական բացակայության դեպքում, արյան ծանր հիվանդությունների ժամանակ (ծանր անեմիա, լեյկոպենիա, թրոմբոցիտոպենիա);

Այս դեղը պարունակում է մեթիլ և պրոպիլ պարաբեններ, որոնք կարող են առաջացնել ալերգիկ ռեակցիաներ, հնարավոր է հետաձգված:

Այս դեղը պարունակում է պանտո (E124), որը կարող է առաջացնել ալերգիկ ռեակցիաներ:

Զգերազանցել նշված դեղաչափը:

Կողմնակի երևույթներ

Բուժական դեղաչափերի դեպքում կողմնակի ազդեցությունները հազվադեպ են և քիչ արտահայտված: Երբեմն արտահայտվում են սրտխառնոցի, փսխման, ստամոքսի ցավի, արյունային ռեակցիաների (թրոմբոցիտոպենիա, նեյտրոպենիա, լեյկոպենիա, ազրանուլոցիտոզ) տեսքով: Երբեմն տեղ են գտնում մաշկի կարմրությունը, եղջջացանն ու գերզգայնության այլ ռեակցիաներ:

Պիտանիության ժամկետը

2 տարի:

Պահման պայմանները

Պահպանել լավ փակված տարայում, մինչև 25°C ջերմաստիճան:

Պահել էրեխաներից հետո վայրում:

Թողարկման ձևը

30մլ պլաստիկ շեփ կաթոցիկով:

Բաց բողման կարգը

Առանց դեղատոմսի: