

Цетамол 100 мг/мл

Состав: Активное вещество: парацетамол 100 мг/мл.

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, сахарин натрия, лимонная кислота, метилпарабен, пропилпарабен, вишневый ароматизатор, пансо. Не содержит этиловый спирт.

Лекарственная форма: детские капли для приема внутрь, со вкусом вишни.

Фармакотерапевтическая группа: нестероидный противовоспалительный препарат.

Фармакодинамика:

Парацетамол клинически доказан как анальгезирующий жаропонижающий.

Анальгезирующее действие парацетамола обусловлено повышением болевого порога, а жаропонижающее — действием на терморегуляторный центр гипоталамуса. Парацетамол с его анальгезирующим и жаропонижающим эффектом равносителен аспирину, но с меньшей вероятностью вызывает нежелательные эффекты, которые специально характерны для аспирина и аспирина содержащих препаратов. Не раздражает желудочно-кишечный тракт и не воздействует на водно-электролитный обмен, так как не воздействует на синтез простагландинов в периферических тканях.

Фармакокинетика:

Парацетамол быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. В крови максимальная концентрация достигается после применения наступает примерно спустя 10-60 минут. Парацетамол распределяется во многих тканях организма. При терапевтической дозе с белками плазмы в незначительном количестве, которое увеличивается при высокой концентрации крови. Период полураспада варьируется от 1 до 3 часов.

Метаболизируется преимущественно в печени и выводится мочой в виде лигандов (глюкуронидов и сульфатов). Менее 5% выводится в неизменном виде.

Показания к применению:

- В качестве жаропонижающего средства – острые респираторные заболевания (ОРЗ), грипп, педиатрических инфекциях и других воспалительных заболеваниях, которые сопровождается повышением температуры, поствакцинальный период.
- В качестве анальгезирующее – при слабой и умеренной болях (головная боль, зубная боль, мышечная боль, невралгии, при травматических болях).

Способ применения и дозы:

Дозировка Цетамол капли зависит от возраста и массы тела ребенка. Однократная доза Цетамол капли составляет 10-15 мг/кг, максимальная суточная доза 60 мг/кг от массы тела. Доза может повторяться каждые 4 часа, но не должна превышать более 5 раз в день.

Дозировка определяется следующим образом: на 1 кг массы тела применяют 2 капли Цетамола.

10 мг = 2 капли;

1 кг = 2 капли.

Возраст	Масса тела ребенок (кг)	Однократная доза
1-3 лет	по назначению врача	
3-5 лет	6-8 кг	12-16 капель
от 5 месяцев до 1 года	8-10 кг	16-20 капель
1-2 лет	10-12 кг	20 - 24 капель
2-3 лет	12-16 кг	24 - 32 капель
4-5 лет	16-21 кг	32 – 42 капель

Если масса тела ребенка существенно отличается от представленной, то необходимо скорректировать соответствующим образом.

Цетамол капли могут применяться как самостоятельно, так и с детским питанием, фруктовым соком или смешиванием с водой.

В качестве жаропонижающего не применять более 3 дней.

В качестве анальгезирующего не применять более 5 дней.

Противопоказания:

- Повышенная чувствительность к парацетамолу и/или к другому компоненту состава;
- Функциональная недостаточность почек и печени.
- Тяжелые нарушения функции печени и почек.

Меры предостережения и предупреждения:

Не применять одновременно с другими препаратами содержащих Парацетамол.

Перед применением у новорожденных и детей до 3 месяцев дети необходимо сначала консультация с врачом.

При случайной передозировке необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Необходимо с осторожностью применять пациентам страдающих сложной почечной или печеночной недостаточностью, при наследственном дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, при тяжелых заболеваниях крови (тяжелая анемия, лейкопения, тромбоцитопения).

Данный препарат содержит метил- и пропил парабены, которые могут вызывать аллергические реакции, возможно отсроченные.

Данный препарат содержит Пансо (Е124), который может вызывать аллергические реакции.

Не превышать указанную дозу.

Побочное действие:

При терапевтических дозах нежелательные эффекты редки и мало выражены. Иногда выражаются тошнотой, рвотой, болю в желудочно-кишечном тракте, реакциями в крови (тромбоцитопения, нейтропения, лейкопения, агранулоцитоз). Иногда бывают покраснения кожи, крапивница и другие реакции гиперчувствительности.

Срок годности:

2 года.

Условия хранения:

Хранить в хорошо закрытой таре, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска:

30 мл пластиковый флакон с капельницей.

Условия отпуска:

Без рецепта.