

Ֆլազոն 500 մգ

Դեղաձև. Մոմիկներ հեռոցային:

Բաղադրություն. Յուրաքանչյուր հեռոցային մոմիկ պարունակում է Ակտիվ նյութ՝ մետրոնիդազոլ 500 մգ:
Օժանդակ նյութեր՝ պոլիէթիլեն գլիկոլ 1500 և 400:

Դեղաբանական խումբ. Հակապրոտոզային դեղ:

Կիրառման ցուցումներ

Ֆլազոնը նախատեսված է որոշ հեռոցային վարակների տեղային բուժման համար՝ սրիխոնոզային վագինիտ (*Trichomonas vaginitis*) և ոչ սպեցիֆիկ վագինիտ:

Հակացուցումներ

Ֆլազոնը հակացուցված է Մետրոնիդազոլի կամ այլ Նիտրոիմիդազոլի ածանցյալների նկատմամբ գերզգայունությամբ հիվանդներին:

Կիրառման ձև և դեղաչափում

Միայն մեծերի համար

-Տրիխոնոզային վագինիտ (*Trichomonas vaginitis*)՝ օրական մեկ հեռոցային մոմիկ, որը հարկավոր է խորը տեղադրել հեռոցի մեջ՝ 10 օր, ներքին ընդունման դեղաձևի հետ համատեղ:

- Ոչ սպեցիֆիկ վագինիտ՝ օրական մեկ հեռոցային մոմիկ, որը հարկավոր է խորը տեղադրել հեռոցի մեջ՝ 7 օր, անհրաժեշտության դեպքում ներքին ընդունման դեղաձևի հետ համատեղ:

Ջեր գուզընկերը պետք է գուգահեռ բուժվի, նույնիսկ եթե նրա մոտ չկան կլինիկական նշաններ:

Կողմնակի երևույթներ

Դադարեցրեք Ֆլազոնի օգտագործումը և անմիջապես դիմեք բժշկի:

1. Ալերգիկ ռեակցիաներ. Նշանները կարող են դրսևորվել ձեռքերի, ոտների, կոճերի, դեմքի, շուրթերի կամ կոկորդի այտուցով, որը կարող է կլման ակտի կամ շնչառության դժվարություններ առաջացնել, բոր, միանվագ ցան կամ եղջերացան:

2. Լուրջ, բայց շատ հազվադեպ կողմնակի ազդեցությունը գլխուղեղի հիվանդությունն է (էնցեֆալոպարիա): Ախտանիշները տարբեր են, բայց կարող է մտնել ջերմություն, պարանոցի կոշտություն, գլխացավ կամ զգայախաբություն: Դուք կարող էք նաև ունենալ ցավեր մկաններում կամ հոդերում, թուլության զգացում արմուկներում կամ ձեռքներում, խոսքի խանգարումներ կամ շփոթվածության զգացում:

3. Ջարգանում է մաշկի ցան, ներառյալ Սթիվենս-Ջոնսոնի համախտանիշը կամ թունավոր էպիդերմալ նեկրոլիզը: Դրանք կարող են ի հայտ գալ որպես թիրախի նման կարմրավուն բծեր կամ շրջանաձև բծեր, որոնք

հաճախ դրսևորվում են մարմնի վրա բտիկներով, մաշկի թեփոտումով, բերանի, կոկորդի, քրի, սեռական օրգանների և աչքերի խոցերով, որոնց կարող են նախորդել տենդը և գրիպի նման ախտանիշները: Դադարեցրեք Ֆլազոնի օգտագործումը, եթե ձեզ մոտ զարգանան այս ախտանիշները և անմիջապես դիմեք ձեր բժշկին կամ բժշկական օգնության:

4. Ձեր մոտ առաջանում է կարմիր թեփուկավոր ցան, որը տարածվում է մաշկի տակ բտիկներով, որն ուղեկցվում է տենդով, բուժման սկզբում (սուր ընդհանրացված էկզանտեմատոզ պուստուլոզ): Դադարեցրեք Ֆլազոնի օգտագործումը, եթե ձեզ մոտ զարգանան այս ախտանիշները և անմիջապես դիմեք ձեր բժշկին կամ բժշկական օգնության:

5. Մաշկի և աչքերի դեղնացում: Սա կարող է պայմանավորված լինել լյարդի խնդրով (դեղնախտով):

6. Անսպասելի վարակներ, բերանի խոցեր, կապտուկներ, լնդերի արյունահոսություն կամ ուժեղ հոգնածություն: Սա կարող է պայմանավորված լինել արյան հետ կապված խնդիրներով:

7. Ստամոքսի ուժեղ ցավ, որը կարող է նույնիսկ ճառագայթել մեջքին (պանկրեատիտ):

Նախագրուցումներ

Ֆլազոն օգտագործելուց առաջ տեղեկացրեք բժշկին կամ դեղագետին, եթե՝

- ունեք կամ երբևէ ունեցել եք լյարդի հետ կապված խնդիրներ,
- անցնում եք երիկամների դիալիզ,
- ունեք նյարդային համակարգի ախտահարումներ:

Ֆլազոնը և ալկոհոլը

Ֆլազոնը ընդունելու ընթացքում պետք չէ օգտագործել խմիչք, ինչպես նաև դրանից հետո 48 ժամերի ընթացքում: Դա կարող է առաջացնել սևախ կողմնակի բարդություններ, ինչպիսիք են սրտխառնոցը, փսխումը, ցավերը որովայնի շրջանում, առաջացնում է կարմրատակում և սրտի բաբախում, գլխացավ:

Հղիություն և կրծքով կերակրում

Կրծքի կաթի մեջ դեղի ներթափանցման պատճառով, այն խորհուրդ չի տրվում օգտագործել կրծքով կերակրման ժամանակ:

Հղիության և կրծքով կերակրման դեպքում բուժումը սկսելուց առաջ միշտ հարկավոր է խորհրդակցել բժշկի կամ դեղագետի հետ:

Թողարկման ձև

5 հեռուցային մոմիկ ստրիպում, տուփ՝ 2-ական ստրիպով և բժշկական կիրառման հրահանգով:

Պիտանիության ժամկետ

3 տարի:

Չօգտագործել տուփի վրա նշված ժամկետից հետո:

Պահպանման պայմաններ

Պահել 25°C -ից ոչ բարձր պայմաններում:

Պահել երեխաներին անհատանելի տեղում:

Բացթողման կարգ

Դեղատոմսով: