

## **ГЕКСПАНТЕН 100 мг + 16 мг**

**Лекарственная форма:** Суппозитории вагинальные.

**Состав:** активные вещества: декспантенол – 100 мг, хлоргексидина биглюконат - 16 мг (в виде хлоргексидина биглюконата раствора 20 % - 80 мг).

Вспомогательное вещество: Основа для суппозиториев: ПЭГ 400 и ПЭГ1500.

**Фармакотерапевтическая группа:** Стимулятор репарации тканей.

### **Фармакодинамика:**

Комбинированный препарат для местного применения в гинекологии, оказывающий регенерирующее, противомикробное, метаболическое действие. Хлоргексидин - активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Treponema pallidum*, *Chlamydia* spp., *Ureaplasma* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.; дрожжей, дерматофитов, простейших (*Trichomonas vaginalis*). К хлоргексидину слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp., а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий.

Декспантенол - стимулирует регенерацию слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько сниженную) в присутствии крови, гноя.

### **Фармакокинетика:**

Хлоргексидин биглюконат: практически не всасывается из ЖКТ. После случайного проглатывания 300 мг Смах достигается через 30 мин и составляет 0,206 мкг/л. Выводится в основном с каловыми массами (90%), менее 1% выделяется почками. При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.

Декспантенол: при местном применении быстро абсорбируется со слизистой оболочки и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулинами и альбуминами).

### **Показания к применению:**

- острые и хронические вагиниты
- эндо/экзоцервициты (в т.ч. осложненные эктопией шейки матки)
- истинная эрозия шейки матки специфической этиологии (в составе комплексной терапии)

- для улучшения регенерации слизистой оболочки влагалища и шейки матки после деструктивных методов лечения (в т.ч. диатермокоагуляция, криодеструкция, лазеродеструкция), в послеоперационном и послеродовом периодах.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

Применяют интравагинально. Перед применением суппозиториев освобождают от контурной упаковки.

Для лечения: по 1 суппозиторию 2 раза в сутки (утром и вечером), в течение 7-10 дней.

При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции, зуд, жжение, проходящие после отмены препарата.

**Меры предосторожности и предупреждения:**

Гекспантен не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально. Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость вагинальных суппозиториев Гекспантен т.к. препарат применяется интравагинально.

**Беременность и период кормления грудью:**

Применение свечей Гекспантен во время беременности и при грудном вскармливании не противопоказано, так как свечи Гекспантен действуют локально во влагалище, практически не всасываясь.

**Форма выпуска:**

5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку. 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

**Срок годности:**

2 года.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре не выше 25°C, в сухом, защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска из аптек:**

Без рецепта.