

Ибуфене 100 мг/5 мл

Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь со вкусом апельсина.

Состав: Каждые 5 мл содержит: Активное вещество – 100 мг ибупрофен.

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, глицерин, метилпарабен, пропилпарабен, сансет желтый, сорбит (раствор), полисорбат 80, апельсиновый ароматизатор, сахароза, аэросил 200, ксанта, очищенная вода.

Фармакотерапевтическая группа: не стероидный противовоспалительный препарат.

Фармакодинамика:

Ибупрофен ингибирует синтез простагландинов за счет снижения активности фермента циклооксигеназы, что приводит к снижению образования прекурсоров простагландина. Ибупрофен оказывает анальгезирующее и жаропонижающее свойства, ревматоидный артрит (включая ювенильный ревматический артрит или болезнь Стилла), анкилозирующий спондилит, остеоартрит и при лечении других ревматоидных (серонегативных) артропатий. При лечении несосудистых ревматоидных заболеваний Ибупрофен показан в определенных случаях, таких как: замороженное плечо (капсулит), бурсит, тендинит, теносиновит и боли в позвоночнике. Ибупрофен может применяться также при повреждениях мягких мышц, к примеру, при расстройстве и деформации тканей.

Анальгезирующие действия Ибупрофена применяются при умеренных болях, к примеру, при дисменорее, зубной и послеоперационных болях и при облегчении головной боли, включая боли мигрени.

Ибупрофен показан также как жаропонижающий, особенно для детей.

Фармакокинетика:

Ибупрофен всасывается из желудочно-кишечного тракта, и максимальная концентрация в плазме крови достигается после приема через 1-2 часа. Ибупрофен 90-99 % связан с белками плазмы и период полураспада составляет 2 часа. Быстро выводится мочой в основном в виде метаболитов и конъюгатов. Примерно 1 % Ибупрофена выводится с мочой в неизменном виде, и примерно 14% в виде конъюгированного Ибупрофена. В грудном молоке может обнаружиться в малом количестве.

Показания к применению:

Ибуфене суспензия показан для применения с 6 месяцев до 12 лет детям, а с 3-6 месяцев только по назначению врача, учитывая общую массу тела ребенка не менее 5 кг.

- В качестве жаропонижающего: при острых респираторных заболеваниях, при гриппе, при педиатрических инфекциях, в постпрививочный период и при разных других заболеваниях, которые сопровождаются повышением температуры.
- В качестве анальгезирующего: при слабой и умеренной болях, к примеру, при скрежете зубов, головной боли, зубной боли, ушной боли, боли в горле, при разных травматических и послеоперационных болях, при невралгиях и мигрени.
- В качестве противовоспалительного: ювенильный ревматический артрит, воспаление сухожилий, тендовагинит.

Противопоказания:

- младенцы до 3 месяцев;
- ранняя имеющаяся чувствительность к Ибупрофену и другим нестероидным противовоспалительным препаратам;
- бронхиальная астма, крапивница;
- при язвенном поражении желудочно-кишечного тракта у ребенка;
- кровотечения в желудочно-кишечном тракте;
- воспалительные заболевания кишечника;
- заболевания крови: лейкопения, гемофилия;
- печеночная или почечная недостаточность.
- Последний триместр беременности

Побочное действие:

При применении препарата могут возникать нежелательные эффекты.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, потеря аппетита, диарея, диспепсические проявления, пептическая язва, возможные редкие кровотечения желудочно-кишечного тракта.

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, осложнение бронхиальной астмы, бронхоспазм, анафилактический шок, редкие периферические отеки.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления, сердцебиение.

Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, раздражительность.

Показания крови: нейтропения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, апластическая анемия.

Беременность и период кормление грудью:**Беременность. Тератогенный эффект. Беременность категории С.**

Репродуктивные исследования на крысах и кроликах не показали признаков аномального развития. Однако, исследования самопроизводства на животных не всегда предсказывают реакцию на людях. Отсутствуют адекватные и хорошо контролируемые исследования у беременных женщин. Во время беременности разрешено использование Ибупрофена, если только потенциальная польза превышает потенциальный риск для плода.

Не гетерогенные воздействия

Из-за известного воздействия НПВП на сердечно-сосудистую систему плода необходимо избегать применение на поздних стадиях недонозаня.

Лактация

Неизвестно, попадает ли препарат из организма в грудное молоко. Поскольку, многие препараты проникают в грудное молоко и имеются потенциально возможные проявления серьезных нежелательных эффектов Ибупрофена, необходимо принять решение о необходимости прекращения кормления грудью или применения препарата, учитывая важность применения препарата у матери.

Меры предосторожности и предупреждения:

Проконсультируйтесь с врачом перед применением, если у ребенка имеется:

- язва;
- проблемы, связанные с кровотечением;
- проблемы с желудком, которые сохраняются или возобновляются, например, изжога, расстройства желудка или боли;
- высокое кровяное давление, заболевания сердца или почек, или применение диуретиков;
- если не употребляли жидкости;
- потеря большого количества жидкости из-за продолжительной рвоты или по причине диареи;
- проблемы или серьезные побочные эффекты, связанные с применением жаропонижающих или анальгезирующих препаратов.

Спросите у врача или работника аптеки, если у ребенка:

- под наблюдением врача по причине любой серьезной заболеваемости;
- принимает рецептурные препараты для антикоагуляции (разжижения крови);
- принимает любые иные препараты;
- принимает любой другой препарат, содержащий ибупрофен, или иной анальгезирующий/жаропонижающий препарат.

При расстройстве желудка, то препарат можно применять с едой или молоком.

При прекращении применения проконсультируйтесь с врачом, если:

- возникают аллергические реакции. Незамедлительно обратитесь к помощи врача;
- лихорадка и боли продолжаются более чем 3 дня;
- во время лечения у ребенка не наблюдаются улучшения в течение дня (24 часа);
- боль или расстройство желудка усиливается или продолжается;
- покраснение в области больной зоны или выделение запаха;
- проявляются новые показания.

Хранить в недоступном для детей месте. При передозировке обратиться за помощью к врачу.

Побочные эффекты

Предупреждения об аллергических реакциях.

Ибупрофен может вызывать серьезные аллергические реакции, которые могут включать:

- крапивница, астма (удушье);
- шок, отек лица.

Предупреждения о желудочном кровотечении

Использование больше, чем рекомендуется, может вызвать кровотечение желудочное.

Предупреждения о болях в горле

Сильные или продолжительные боли в горле или ангина, которая сопровождается высокой температурой, головной болью, рвотой или тошнотой, могут быть серьезными.

При болях не использовать более 10 дней, при лихорадке – не более 3 дней. Не применять более 2 дней и не назначать детям младше 3 лет без консультации врача. Не применять, если у ребенка когда-либо проявлялись аллергические реакции к любому другому жаропонижающему препарату.

Очень важно не применять при последнем триместре беременности, исключением является если назначен со стороны врача, так как препарат может привести к проблемам к новорожденному ребенку или к осложнениям в период беременности.

Способ применения и дозы:

Доза зависит от возраста ребенка и от массы тела. Однократная доза Ибупрофена состоит 5-10 мг/кг от массы тела, максимальная суточная доза составляет 30 мг/кг от массы тела. В течение 24 часов Ибупрофен разрешается применять 3-4 раза. Эффект препарата сохраняется до 8 часов.

Возраст	Средняя масса тела	Однократная доза	Максимальная суточная доза
3-6 месяцев		По назначению врача	
от 6 месяцев до 1 года	7-10 кг	2.5 мл (50 мг)	200 мг
1-3 лет	10-16 кг	2.5-5 мл (50-100 мг)	300 мг
4-6 лет	18-22 кг	7.5 мл (150 мг)	450 мг
7-9 лет	24-28 кг	10 мл (200 мг)	600 мг
10-12 лет	30-36 кг	15 мл (300 мг)	900 мг

- В качестве анальгезирующего использовать не более 5 дней.
- В качестве жаропонижающего использовать не более 3 дней.

Форма выпуска:

100 мл флакон с мерным колпачком.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном месте от детей.

Срок годности:

3 года. При вскрытии использовать в течение 6 месяцев.

Условия отпуска из аптеки:

Без рецепта.