

ИЗОКОНАЗОЛ-М 600мг

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные по 600 мг.

Состав: 1 суппозиторий содержит: активное вещество: изоконазола нитрат 600 мг.

Вспомогательное вещество: полиэтиленгликоль 1500 и полиэтиленгликоль 400.

Фармакотерапевтическая группа: противогрибковое средство.

Фармакологические свойства:

Изоконазол – синтетическое производное имидазола. Оказывает местное противогрибковое и антибактериальное действие. Действует фунгистатически. Активен в отношении дерматофитов, плесневых, дрожжевых и дрожжеподобных грибов, а также грамположительных бактерий (стафилакокки, микрококки, стрептококки). Ингибирует синтез эргостерина и изменяет состав мембраны микробной клетки.

Показания к применению:

Грибковые инфекции влагалища, в т.ч. смешанные инфекции, вызванные грамположительными бактериями.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к активному веществу или к любому из вспомогательных компонентов.

Способ применения и дозы:

Вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище. Лучше всего это делать в положении лежа, в вечернее время непосредственно перед сном, 1 раз/сут однократно. Для облегчения введения следует использовать прилагаемые напальчники. При необходимости можно повторить курс лечения через 7- 10 дней. Лечение не следует проводить во время менструации.

Побочное действие:

При применении препарата могут отмечаться местные реакции, такие как раздражение, жжение и зуд. В редких случаях возможно развитие аллергических реакций в месте применения препарата.

Меры предосторожности и предупреждения:

Не рекомендуется проводить спринцевание во время лечения, а также в течение недели после лечения.

Для предупреждения повторного инфицирования рекомендуется ежедневно менять и кипятить личные бельевые принадлежности (полотенца, нижнее белье - предпочтительно из хлопка).

Рекомендуется одновременное лечение полового партнера.

Беременность и период кормления грудью:

Опыт использования содержащих изоконазол препаратов во время беременности не указывает на наличие у них риска тератогенности для человека.

В связи с очень небольшой абсорбцией (менее 5%) и очень короткой продолжительностью терапии, можно исключить вероятность вреда, обусловленного попаданием лекарственного вещества в материнское молоко, для ребенка, находящегося на грудном вскармливании.

Форма выпуска:

1 вагинальный суппозиторий в блистере с двумя напальчиками, 1 блистер в картонной упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше +30°C в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек:

по рецепту врача.