

Նիֆուրոմեդ 220 մգ / 5 մլ

Դեղածև. Ներքին ընդունման դեղակախույթ:

Բաղադրություն. 5 մլ դեղակախույթը պարունակում է. Ակտիվ բաղադրատարր նիֆուրոկսազիդ 220 մգ:
Օժանդակ նյութեր. Շաֆար, ֆսանտան, մեթիլպարաբեն, պրոպիլպարաբեն, բանանի բուրավետիչ:

Դեղաբանական խումբ. Հակամիկրոբային դեղ աղիների ինֆեկցիոն-բորբոքային հիվանդությունների բուժման համար:

Ֆարմակոլոգիա

Հակամիկրոբային միջոց, ազդեցության լայն սպեկտրով, նիտրոֆուրանի ածանցյալ: Մանրէի բջջում կանխում է դեհիդրոգենազայի ակտիվությունը և նույն ժամանակ շարժան՝ եոկարբոնաթթվի և մի շարք այլ բիոսինթետիկ սպինթեզների ցիկլի ընթացքում: Քայքայում է հարուցիչի բջջաթաղանթը, իջեցնում միկրոօրգանիզմների կողմից արտադրվող բույրերի արտադրությունը: Ակտիվացնում է տեղային իմունիտետը և ակտիվացնում ֆագոցիտոզը:

Արդյունավետ է գրամդրական (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Haemophilus influenzae*) և գրամբացասական (*Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Escherichia coli*, *Shigella spp.*, *Proteus spp.*) միկրոօրգանիզմների հանդեպ: Չի խախտում աղիքային միկրոֆլորայի հավասարակշռությունը: Սուր բակտերիալ փորլուծության ժամանակ վերականգնում է աղիքային էուբիոզը:

Պերորալ կիրառումից հետո չի ներծծվում ստամոքսաղիքային համակարգում, աղիներում գոյացնում է ազդող նյութի մեծ խտություն և ցուցաբերում է բուժական արդյունավետ ազդեցություն: Նման դեղաբանական ազդեցության շնորհիվ նիֆուրոֆսազիդը ցուցաբերում է բացառապես տեղային աղիքային հակաէնթերապիա ազդեցություն, չունի համակարգային հակամանրէային ազդեցություն, չի առաջացնում ընդհանուր թունավոր արդյունք և դիսբակտերոզ, արտազատվում է կղանքով: Դեղը չի ազդում արյան անալիզների կլինիկական և կենսաքիմիական ցուցիչների վրա:

Կիրառման ցուցումներ

- Փորլուծության բուժում, դեղերի նկատմամբ զգայուն ինֆեկցիաների կողմից հարուցված
- Խրոնիկ կալիտի և էնտերոկոլիտի կամպլեքս բուժում

Հակացուցումներ

Եթե կա զգայունություն որևէ կոմպոնենտի նկատմամբ, նաև ալերգիա 5-նիտրոֆուրանների հանդեպ: Երեխաներին մինչև 2 ամսական և անհաս երեխաներին:

Կիրառման ձև և դեղաչափում

Նիֆուրոմեդը նախատեսված է ներքին ընդունման համար: Օգտագործելուց առաջ թափահարել, մինչև դառնա միասեռ դեղակախույթ:

Դեղաչափ երեխաների համար.

2-6 ամսական – 2,5 մլ, օրը 2 անգամ

6 ամսականից 6 տարեկան – 5 մլ, օրը 3 անգամ

6 տարեկանից բարձր – 5 մլ, օրը 4 անգամ

Դեղաչափը մեծերի համար – 5 մլ, օրը 4 անգամ:

2,5 մլ Նիֆուրամեդը պարունակում է 110 մգ նիֆուրօֆսազիլ:

5 մլ Նիֆուրամեդը պարունակում է 220 մգ նիֆուրօֆսազիլ:

Դեղը խորհուրդ է տրվում ընդունել հավասար ժամային ինտերվալներով, անկախ սննդի ընդունումից: Բուժման տևողությունը 5-7 օր:

Կողմնակի երևույթներ

Նիֆուրամեդը գրեթե չի առաջացնում կողմնակի երևույթներ, երբեմն կարող է նկատվել որովայնի շրջանում ցավեր, սրտխառնոց, փորլուծության ուժեղացում: Այս սիմպտոմների առկայության դեպքում չպետք է դեղի կիրառումը դադարեցնել: Եզակի դեպքերում հնարավոր է անհատական գերզգայունություն դեղի նկատմամբ (շնչառության պակաս, մաշկային ցան, ֆոն), որի ժամանակ պետք է դադարեցնել դեղի կիրառումը:

Նախազգուշացումներ

Դեղը չեն նշանակվում որպես մոնոթերապիա՝ սեպտիկեմիայի պատճառով բարդացած աղիքային վարակների բուժման համար: Զրազրկման ախտանիշների առկայության դեպքում բուժման հետ համատեղ անհրաժեշտ է իրականացնել ռեհիդրացիոն թերապիա (մեծահասակների համար՝ օրական մոտ 2 լիտր հեղուկ): Բուժման ընթացքում դուրս պետք է հետևել որոշակի սննդակարգի. մի կերեք հում մրգեր և բանջարեղեն, հյութեր, կծու և ծանր սնունդ մարսողության համար: Նախքան նորածիններին նշանակելը, անհրաժեշտ է բացառել սախարոզը ֆայֆայդ ֆերմենտների բնածին անբավարարությունը: Դեղը պարունակում է սախարոզա, որը պետք է հաշվի առնել շափարային դիաբետով հիվանդների մոտ օգտագործելիս:

Հղիություն և կրծքով կերակրում

Հղիության և կրծքով կերակրելու ժամանակ դեղի կիրառման հետևանքով պտղի վրա վտանգավոր ազդեցության մասին տվյալներ չկան: Անհրաժեշտության դեպքում հղիներին և կերակրող մայրերին կարելի է նշանակել զգուշությամբ:

Թողարկման ձև

100 մլ ապակե շշով, չափիչ բաժակով և ներդիր թերթիկով, ստվարաթղթե տուփի մեջ:

Պիտանիության ժամկետ

3 տարի:

Բացելուց հետո կիրառել 14 օրվա ընթացքում:

Պահպանման պայմաններ

Ջուր, երեխաների համար անհատանելի վայրում, 25°C ոչ բարձր պայմաններում:

Բացթողման կարգ

Դեղատոմսով: