

Регид солушн 330 мл

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь со вкусом банана.

Состав: 5 мл раствора содержит: натрия хлорид 17,5 мг, натрия цитрат 14,5 мг, калия хлорид 12,5 мг, глюкоза 55,7 мг.

Вспомогательные ингредиенты: бензоат натрия, лимонная кислота моногидрат, банановый ароматизатор, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа: препарат электролитов с углеводами. Солевые составы для пероральной регидратации.

Фармакологические свойства

Îññáíáÿ òäëü ìðèíáíáèÿ Ðáäèä Ñíëóøíá - áññòáñáëáíèá èñëíòñ-ùáëí+ñáí ðááñááñèÿ, íàðóøáíñáí, áñëááñðàèá ìòáðè ÿëáèððíëèðíá ìðè ðáíðà è àèàðáá. Ó áíëüíúñ ñ áááëäðàðàèèáé ìððíðáëüíáÿ ðááëäðàðàèèíáÿ ðáðáíèÿ ÿðèì ìðáíáðàðòñ ñíñíáñòáóáð áúñððíë ðááëäðàðàèèè.

Ðáäèä ñíëóøí ñíááðæèð ñááëáíèèðíáíñá èíèè-áñðáí ÿëáèððíëèðíá á áíáá. Ýëáèððíëèðú èáðáðò ñññáíóð ðíëü á òñðáíáëáíèè èíñíáí ðááñááñèÿ. Ðíëü òèððàðà çáèèþ-ááðñÿ á èíððáèèè àèèáíçà, ðáçáèáøááñÿ á ðáçóëüðàðà àèàðáè è ðáíðú. Õèððàð ðàèæá ñáúøááð áñáñúááíèá èññá íàððèÿ è ÿáëÿáðñÿ áíèáá ñòááëëüíú ñ ñðááíáíèþ ñ áèèàðáíáðòñ. Èñáëíáèèÿ ÿëáèððíëèðíá ñðèìóèèðáð áñáñúááíèá áíáú è ÿëáèððíëèðíá èç ÆËÏ, ðáí ñàìúì ìðááíðáðáúááð áááëäðàðàèèþ ìðè àèàðáá è ðáíðà.

Ãèþèíçà ñíñíáñòáóáð ááñíðáèèè ñíèáé è òèððàðíá, ÷ðí ñññááð ñáááðæèááðú ìàðááíèè-áñèèé àèèáíç.

Áíáá: ññðááðòñòáóðúáá èíèè-áñðáí ÿáëÿáðñÿ ñóúáñðááíúì äëÿ èíððáèèè áááëäðàðàèèè.

Показания к применению:

- восстановление водно-электролитного равновесия при дегидратации у взрослых и у детей, связанной с острой диареей и рвотой различной этиологии
- коррекция ацидоза при острой диарее (включая холеру);
- диарея с легкой или умеренной дегидратацией (например, потеря массы тела у детей 3-9%);
- тепловой стресс с сопутствующим нарушением водно-электролитного баланса;

С целью профилактики - при тепловых и физических нагрузках, приводящих к интенсивному потоотделению.

Способ применения:

Раствора Регид солушн® зависит от веса и возраста пациента, а также от стадии и тяжести состояния. Раствор следует принимать после каждого жидкого опорожнения, небольшими глотками.

При тяжелой дегидратации, когда масса тела уменьшается на 10%, нужно провести дегидратацию путем введения внутривенных средств. *При легком и умеренном обезвоживании* количество потребления раствора зависит от массы тела и степени обезвоживания. В первые 6-10 часов от начала обезвоживания доза может достигать 30–60 мл/кг массы тела. Максимальная суточная доза составляет 65 мл/кг массы тела. При дальнейшем обезвоживании необходимо дополнительное применение препарата. Взрослым и детям при легкой и средней степени дегидратации следуют данным, приведенным в таблице.

| Масса тела кг | ≥5 | 5-7.9 | 8-10.9 | 11-15.9 | 16-29.9 | >30 |
|--|--------|---------|---------|----------|-----------|------|
| Максимальное суточное потребление Р-р мл | 330 мл | 330-520 | 520-720 | 720-1000 | 1000-2000 | 2000 |

Предупреждение дегидратации.

Для предотвращения потери жидкости из организма Регид солушн® применяют в более меньших количествах. Прием Регид солушна® следует начинать, как только началась диарея. Как правило, принимать раствор необходимо не более 3–4 дней; прекращают прием после устранения диареи.

Для предупреждения обезвоживания разовый прием может составлять 5–15 мл/кг массы тела:

- дети с массой тела до 10кг: 50-100мл раствора после каждого жидкого опорожнения;
- взрослые и дети с массой тела от 10 кг: 100-200мл раствора после каждого жидкого опорожнения. В случае диареи, сопровождающейся рвотой, указанное количество можно применять в разделенном виде (от 5мл до 10мл, каждые пять минут), затем можно постепенно увеличить количество до тех пор, пока ребенок не будет в состоянии нормально пить.

Противопоказания:

- нарушения функции почек;
- сахарный диабет;
- потеря сознания;
- кишечная непроходимость (илеус);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Меры предосторожности и предупреждения:

Не следует применять людям с гиперкалиемией, фенилкетонурией.

Регид солушн® не следует разбавлять водой или другими растворителями, так как он готов к применению. Препарат разрешен к применению в рекомендуемых дозах при беременности и в период кормления грудью.

Не следует применять препарат детям в возрасте до 3 месяцев без консультации с врачом.

Форма выпуска:

Пластиковая бутылка по 330 мл.

Срок годности:

2 год.

Условия хранения:

Хранить в сухом месте ниже 25°C, в недоступном для детей месте. После вскрытия можно использовать в течении 48 часов.

Условия отпуска из аптеки:

Без рецепта.