

Զիդին 16 մգ

Դեղաձև. հեշտոցային մոմիկներ 16 մգ:

Բաղադրություն. 1 մոմիկը պարունակում է ակտիվ նյութ՝ ֆլորիեֆալդին բիզլուպտոնատ 16 մգ:

Օժանդակ նյութեր . հիմն մոմիկների համար. պոլիէթիլէնօֆսիլ 400 և պոլիէթիլէնօֆսիլ 1500:

Դեղաբանական խումբ. հականեխիչ դեղամիջոց տեղային օգտագործման համար:

Դեղաբանական ազդեցություն

Զիդինը համարվում է հականեխիչ դեղամիջոց տեղային կիրառման համար, արդյունավետ է գրամդրական և գրամբացասական միկրոօրգանիզմների հանդեպ. *Treponema pallidum*, *Chlamydia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, *Herpes virus*: Դեղի հանդեպ թույլ զգայուն են որոշ բուսական *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.*, նաև կայուն են թրվակայուն բակտերիաների նրանց սպորների, սնկերի և վիրուսների հանդեպ: Զիդինը չի ընկնում լակտոբակտերիաների ֆուկցիոնալ ակտիվությունը: Պահպանում է որոշակի ակտիվություն արյան և թարախի առկայության դեպքում: Պրակտիկորեն չի ներծծվում ստամոքսաղիքային համակարգից: Պատահական կուլ տալու դեպքում 300 մգ CMAX հասնում է 30 րոպե հետո և կազմում է 0,206 մկգ/լ: Արտազտվում է հիմնականում կղանքով (90%), 1 %-ից փչ արտազատվում է երիկամներով: Ներհեշտոցային կիրառման ժամանակ պրակտիկորեն չի ներծծվում և համակարգային ազդեցություն չի ցուցաբերում:

Կիրառման ցուցումներ

- Վեներական հիվանդությունների կանխարգելման ժամանակ. գոնորեա, սիֆիլիս, սրիխոմոնիազ, գարդներելիոզ, խլամիդիոզ և ուրեոպլազմոզ: Զիդինի կիրառումը կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ է կատարել չպաշտպանված սեռական ակտից հետո 2 ժամվա ընթացքում, քանի որ 2 ժամ անց հարուցիչը ներթափանցում է հեշտոցի լորձաթաղանթի բջջի մեջ և ֆլորիեֆալդինի հանդեպ դառնում է անհասանելի:
- Ինֆեկցիոն բորբոքային բարդությունների առաջացման կանխարգելման նպատակով մակաբարձ-գինեկոլոգիական միջամտությունների ժամանակ, ծննդաբերություններից և աբորտներից առաջ, գինեկոլոգիական հիվանդությունների վիրահատական միջամտությունից առաջ, ՆԱՊ-ի դնելուց առաջ և հետո, արգանդի պարանոցի դիոթերմոկոագուլյացիայից առաջ և հետո, ներարգանդային հետազոտություններից առաջ:
- Խրոնիկական էնդո- և էկզոցերվիցիտների բուժում, սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ վագինիտներ, գրգռիչների բազմաբաղադրիչ բաղադրությամբ:

Հակացուցումներ

Գերզգայունություն ակտիվ նյութի կամ օժանդակ նյութերից որևէ մեկի հանդեպ:

Մինչև 18 տարեկան երեխաներ:

Կիրառման ձև և դեղաչափում

Կիրառումից առաջ մոմիկը հանել խցիկից:

Բուժման նպատակով. 1 մոմիկից օրը 2 անգամ (առավոտյան և երեկոյան) 7-10 օր:

Ըստ անհրաժեշտության հնարավոր է բուժման ընթացքի երկարացում մինչև 20 օր:

Սեռական հանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաների կանխարգելման նպատակով. 1 մոմիկ չպաշտպանված սեռական հարաբերությունից հետո 2 ժամվա ընթացքում:

Կողմնակի երևույթներ

Հնարավոր են ալերգիկ ռեակցիաներ, քոբ, դեղը կիրառումը դադարեցնելուց հետո երևույթները անհետանում են:

Նախագրուշացումներ

Զիդինը անհամատեղելի է անիոնային խումբ պարունակող դեղերգեղտների հետ (սապոնիններ, նատրիումի լաուրիլսուլֆատ, նատրիումի կաոբոֆսիմեթիլցելյուլոզ) և օմաոի հետ, եթե այն կիրառվում է ներհեռուցային: Արտաֆին սեռական օրգանների հիգիենիկ խնամքը չի ազդում Զիդինի մոմիկների արդյունավետության և կիրառման վրա: Զի թույլատրվում միաժամանակյա օգտագործումը յոդի հետ:

Հղիություն և կրծքով կերակրում

Զիդինի օգտագործումը հղիության և կրծքով կերակրման ժամանակ հակացուցված չէ, քանի որ Զիդինը ազդում է տեղային հեռուցի վրա, պրակտիկորեն չի ներծծվում:

Զիդինի օգտագործումը հղիության և կրծքով կերակրման ժամանակ հնարավոր է միայն մոր համար սպասվող օգուտի և պտղի և երեխայի համար ռիսկի մանրակրկիտ գնահատումից հետո:

Թողարկման ձև

10 հեռուցային մոմիկ խցիկում, 2 խցիկ ներդիր թերթիկով տուփում:

Պիտանիության ժամկետ

2 տարի:

Պահպանման պայմաններ

Պահել չոր, լույսից պաշտպանված և երեխաների համար անհասանելի վայրում, 25°C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում:

Բացթողման կարգ

Առանց դեղատոմսի: